




## ESTERÓIDES ANABOLIZANTES


### SUBSTITUTOS SINTÉTICOS DA TESTOSTERONA




Os esteróides anabolizantes são substâncias similares à testosterona, desenvolvidas em laboratório para a reposição deste hormônio em indivíduos que apresentam déficit do mesmo por alguma razão.



A testosterona é responsável pelo aparecimento das características sexuais masculinas. Além disso sua ação contribui para o aumento da massa muscular. Tal característica faz com que muitos esportistas utilizem anabolizantes sintéticos visando a acelerar o crescimento da musculatura.



O padrão de consumo nesses casos chega a exceder em mais de cem vezes as doses médicas habituais. Além disso, tais atletas combinam inadvertidamente várias marcas, inclusive anabolizantes de uso veterinário, sobre os quais não se tem nenhuma idéia acerca dos riscos em humanos. Desta maneira, o consumo ilícito de tais substâncias expõe seus usuários a uma série de danos à saúde, além de não haver estudos comprovem que os mesmos aumentam de fato a massa, a força e a resistência muscular.



#### COMPLICAÇÕES GERAIS RELACIONADAS AO CONSUMO DE ANABOLIZANTES

- \* Nervosismo
- \* Irritação
- \* Agressividade
- \* Problemas no fígado (hepatite, câncer)
- \* Acne grave
- \* Problemas sexuais
- \* Problemas cardiovasculares
- \* Diminuição da imunidade

#### COMPLICAÇÕES DO RELACIONADAS AO CONSUMO DE ANABOLIZANTES NO HOMEM

- \* Redução dos testículos
- \* Diminuição do número de espermatozoides
- \* Impotência
- \* Infertilidade
- \* Calvície
- \* Desenvolvimento de mamas
- \* Aumento da próstata
- \* Dificuldade e / ou dor para urinar

## COMPLICAÇÕES CLÍNICAS

O Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) afirma que além das complicações gerais, outros efeitos podem ser observados, de acordo com o sexo e a idade dos usuários. No **homem**, há redução dos testículos, diminuição de espermatozoides, impotência, infertilidade, calvície, desenvolvimento de mamas, dificuldade ou dor para urinar e aumento da próstata. Na **mulher**, nota-se crescimento de pêlos faciais, alterações ou ausência de ciclo menstrual, aumento do clitóris, voz grossa, diminuição de seios. Alguns desses efeitos são irreversíveis, ou seja, mesmo na ausência do anabolizante não há retorno da condição normal. No **adolescente**, pode haver maturação esquelética prematura e puberdade acelerada, levando a um crescimento raquítico e baixa estatura.

Ainda segundo o CEBRID, qualquer usuário pode vivenciar um ciúme doentio, ilusões, sentimentos de invencibilidade, distração, confusão mental e esquecimentos. Em alguns casos, há distorção da percepção corporal, tendo a falsa sensação de musculatura pouco desenvolvida. Usuários, freqüentemente, tornam-se clinicamente deprimidos quando param de tomar a droga, perdem a massa muscular que adquiriram e ficam, por isso, mais propensos ao uso continuado (dependência).

### COMPLICAÇÕES RELACIONADAS AO CONSUMO DE ANABOLIZANTES NA MULHER

- \* Pêlos faciais
- \* Alterações ou ausência do ciclo menstrual
- \* Aumento do clitóris
- \* Voz grossa
- \* Diminuição dos seios

### COMPLICAÇÕES DO RELACIONADAS AO CONSUMO DE ANABOLIZANTES NOS JOVENS

- \* Maturação precoce da estrutura esquelética (baixa estatura)
- \* Início precoce da adolescência

